

Exercice 1 *Équivalence*

La proposition

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 = 9) \iff (x = 3)$$

est-elle vraie ?

Exercice 3 *Véracité*

Déterminer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant.

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$ | 12. $\exists ! z \in \mathbb{R} : \cos z = 0$; |
| 2. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ | 13. $\exists x \in \mathbb{R} : (x \leq x^2 \text{ et } x = e^{-x})$; |
| 3. $\exists M \in [0, 2[, \forall x \in [0, 2[, x \leq M$ | 14. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} : n + m \text{ est impair}$; |
| 4. $\exists M \in [0, 2[, \forall x \in [0, 2[, x \geq M$ | 15. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} : nm \text{ est impair}$; |
| 5. $1 + 1 = 2 \implies 1 + 1 = 3$; | 16. $\exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x \leq \eta \implies x^2 \leq 1$. |
| 6. $1 + 1 = 3 \implies 1 + 1 = 2$; | 17. $\exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x \leq \eta \implies x^2 \leq 1$. |
| 7. $1 = 0 \implies \exists p, q, r \in \mathbb{Z} : p^3 + q^3 + r^3 = 115$; | 18. $\exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x \leq \eta \implies x^2 \leq 10^{-18}$; |
| 8. $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$; | 19. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x \leq \eta \implies x^2 \leq \varepsilon$; |
| 9. $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$; | 20. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x \leq \eta \implies x^n \leq \varepsilon$. |
| 10. $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 - n \text{ est pair}$; | |
| 11. $\exists x \in \mathbb{R}_+ : x < \sqrt{x}$; | |

Exercice 4 *Traduction mathématiques \rightarrow français*

Traduire en langage courant (et éclairant) les assertions mathématiques suivantes, puis déterminer (sans justifier) leurs valeurs de vérité.

- | | |
|---|---|
| 1. $\forall n \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N}, n \leq N$ | 3. $\forall y \in \mathbb{R}_+^* \exists x \in \mathbb{R}, y = e^x$ |
| 2. $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \leq N$ | 4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}_+^* y = e^x$ |

Exercice 5 *Traduction français \rightarrow mathématiques*Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Traduire les assertions suivantes dans le langage mathématique (avec des quantificateurs) :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. f est croissante. | 4. f n'est pas une fonction constante. |
| 2. f s'annule. | 5. f ne prend jamais deux fois la même valeur. |
| 3. f est la fonction nulle. | 6. f s'annule au plus une fois. |

Exercice 6 *Ensembles*

Écrire en langage mathématique les ensembles suivants :

- l'ensemble des entiers naturels divisibles par 3.
- l'ensemble des entiers qui sont la somme de deux carrés d'entiers.
- l'ensemble des nombres complexes dont les parties réelle et imaginaire sont des entiers relatifs.

Exercice 7 Intervalles de \mathbb{R}

Soit $a < b < c < d$ quatre réels. Décrire les ensembles suivants.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. $[a, c] \cup [b, d]$; | 4. $[a, c] \setminus [b, d]$; |
| 2. $[a, c] \cap [b, d]$; | 5. $[a, d] \setminus [b, c]$; |
| 3. $[a, b] \cap [c, d]$; | 6. $[b, c] \setminus [a, d]$. |

L'intersection de deux intervalles est-elle toujours un intervalle ? et l'union ?

Exercice 8 Appartenance et inclusion

Soit $E = \{a, b, c\}$ un ensemble. Quelles sont les assertions vraies ?

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. $a \in E$ | 4. $\emptyset \in E$ |
| 2. $a \subset E$ | 5. $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ |
| 3. $\{a\} \subset E$ | 6. $\{\emptyset\} \subset E$ |

Exercice 9 Ensemble des parties

Décrire en extension l'ensemble $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))$.

Exercice 10

Soit A et B deux ensembles. Montrer que :

- $A \subset B \iff A \cup B = B$
- $A = B \iff A \cap B = A \cup B$

Exercice 11 () Une équation ensembliste**

Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . Résoudre l'équation $A \cup X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 12 Image directe, image réciproque

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Déterminer les ensembles suivants :

- | | |
|---|--|
| 1. $f^{\rightarrow}(\mathbb{R})$ | 5. $f^{\leftarrow}([-5, -3[)$ |
| 2. $f^{\rightarrow}([-3, 2])$ | 6. $f^{\leftarrow}([-4, 4])$ |
| 3. $f^{\rightarrow}([-3, 3])$ | 7. $f^{\rightarrow}(f^{\leftarrow}(\mathbb{R}_-))$ |
| 4. $f^{\rightarrow}(\{-5\} \cup [-1, 1])$ | 8. $f^{\leftarrow}(f^{\rightarrow}(\mathbb{R}_-))$ |

Exercice 13 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives ?

- | | |
|--|---|
| 1. $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x - 2 $ | 5. $f_5 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $x \mapsto x^3$ |
| 2. $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$ | 6. $f_6 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto 2y$ |
| 3. $f_3 : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{3x + 1}{4x + 1}$ | 7. $f_7 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(x, y) \mapsto (1, x - y, y)$ |
| 4. $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$ | 8. $f_8 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (2x + y, 3x - 2y)$ |

Exercice 14 Des applications de \mathbb{N} dans \mathbb{N}

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$g(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{n-1}{2} & \text{sinon} \end{cases}$$

Étudier l'injectivité et la surjectivité de f et g . Que vaut $g \circ f$? Qu'en retenir?

Exercice 15 Encore un peu d'images

Soit $f : x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$.

1. Déterminer l'image de f .
2. Montrer que f est injective sur $[-1, 1]$ et y déterminer sa réciproque.
3. Déterminer $f^{-1}([\frac{1}{4}, 1])$.

Exercice 16 Bijectivité et imparité

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bijective. Montrer que f est impaire si et seulement si f^{-1} l'est. A-t-on le même résultat pour la parité?

Exercice 17 Une composée

Soit E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow E$ deux applications. On suppose $f \circ g \circ f$ bijective. Montrer qu'alors f et g le sont aussi.

Exercice 18 Images directe et réciproque

Soit $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$\forall z \in \mathbb{C}^*, f(z) = \frac{z}{|z|}$$

1. Montrer que $\text{Im}(f) = \mathbb{U}$.
2. Déterminer $f^{-1}(\{1\})$.
3. f est-elle injective, surjective, bijective?

Exercice 19 Injectivité, surjectivité

Les applications suivantes définies de E dans F sont elles bien définies? Injectives? Surjectives?

1. $E = \mathbb{Z}, F = \mathbb{Z}, f_1 = x \mapsto \frac{x}{2}$
2. $E = \mathbb{Z}, F = \mathbb{Q}, f_2 = x \mapsto \frac{x}{2}$
3. $E = \mathbb{Z}, F = \mathbb{Z}, f_3 = x \mapsto 2x$
4. $E = \mathbb{Z}, F = \mathbb{Q}, f_4 = x \mapsto 2x$
5. $E = \mathbb{N} \times \{-1, 1\}, F = \mathbb{Z}, f_5 = (n, s) \mapsto ns$
6. $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, F = \mathbb{Q}, f_6 = (a, b) \mapsto \frac{a}{b}$

Exercice 20 Propriétés fondamentales

Pour chacune des relations suivantes, déterminez : si la relation est réflexive, si elle est transitive, si elle est symétrique, si elle est antisymétrique.

Justifier ensuite que la relation est ou n'est pas : une relation d'équivalence, un ordre, un ordre total.

Si la relation est une relation d'équivalence, donner ses classes d'équivalences.

1. E étant un ensemble ayant au moins deux éléments, la relation d'égalité sur l'ensemble E .
2. E étant un ensemble ayant au moins deux éléments, la relation d'inclusion sur l'ensemble (E) .
3. La relation de colinéarité sur l'ensemble des vecteurs du plan.
4. La relation d'orthogonalité sur l'ensemble des vecteurs du plan.
5. La relation de divisibilité sur $\mathbb{R}[X]$ (ensembles des polynômes à coefficients réels). Cette relation se note $|$ et elle est définie comme suit : pour $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$, on a $P(X)|Q(X) \Leftrightarrow \exists D(X) \in \mathbb{R}[X], Q(X) = D(X)P(X)$.
6. E étant un ensemble ayant au moins deux éléments, la relation vide sur E .
Cette relation est définie comme suit : étant donné $a \in E$ et $b \in E$, a n'est jamais en relation avec b .
7. Étant donnée une application $f : E \rightarrow F$, la relation R définie sur E comme suit : étant donné deux éléments a et b de E , $aRb \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.
8. E étant un ensemble fini, la relation d'équipotence \simeq définie sur (E) de la façon suivante : $A \simeq B \Leftrightarrow$ il existe une bijection de A dans B .

Exercice 21 Relations sur $\{1, 2\}$

Parmi les 16 relations (pourquoi 16 ?) sur $\{1, 2\}$, donner la liste :

1. de toutes les relations d'équivalence,
2. de toutes les relations d'ordre,
3. de toutes les relations d'ordre total.

Exercice 22 Une relation d'ordre (*)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On définit une relation \leq_f sur \mathbb{R} en posant pour tous x et y réels :

$$x \leq_f y \iff f(y) - f(x) \geq |y - x|$$

1. Montrer que \leq_f est une relation d'ordre.
2. Montrer que \leq_f est totale si et seulement si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \geq |y - x|$$

3. Á quoi correspond la relation $\leq_{Id_{\mathbb{R}}}$?

Exercice 23 Une partie bornée

Soit $A = \{(-1)^n + \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}\}$. Montrer que A est bornée. Déterminer $\inf A, \sup A$.

Exercice 24 Inclusion et bornes inférieures et supérieures

Soit A et B deux parties de \mathbb{R} , non vides et majorées. Comparer $\inf A, \sup A, \inf B, \sup B$.

Exercice 25 Avec la relation de divisibilité (*)

On travaille dans \mathbb{N} muni de la relation de divisibilité. L'ensemble $\{2^n, n \in \mathbb{N}\}$ possède-t-il un plus petit élément ? Un plus grand élément ? Une borne inférieure ? Une borne supérieure ?